

楽しくつくって、おいしく食べよう

キャベツ



キャベツ栽培ポイント

- 耕土が深く排水の良い砂壤土～粘質壤土が適しています。
- アブラナ科の連作をすると土壌伝染性病害が発生しやすくなるので3～4年の輪作を行いましょう。
- 抽苔や寒害、病害にならないように、作型にあわせて適した品種を選びましょう。
- 発芽適温は15～30℃、生育適温は15～20℃。花芽分化は低温によって誘発され、その後の高温で抽苔(とう立ち)します。抽苔を防ぐには10℃以上の暖かさで苗を育てましょう。

オルトランの決め手は優れた浸透移行性！



作物に
オルトランを
まく

吸収され、
ひろがり、
作物全体を
ガード

長く安定した
殺虫効果



害虫防除は、まいて安心！

オルトラン[®] 粒剤

農林水産省登録
第19993号

適用作物と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 1回以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布	


2016年2月現在

キャベツの栽培方法



1 畑の準備

畑は苗を植える1ヶ月前までに堆肥を、1週間程前までに元肥を入れて深く耕します。




2 植えつけ

本葉が5~6枚になったら植えつけます。午前中に行いましょう。十分灌水し、液肥をすると活着が進みます。




定植時植穴処理

苗を40cm程の間隔で植えていきます。深植にならないように注意します。



オルトラン粒剤の使い方

3 追肥・土寄せ



植えつけから2週間後位と本葉が15~20枚の頃に追肥と土寄せを行います。

チャック付になりました!



新パッケージ



4 収穫

球を手でおさえてみて堅くしまってきたら収穫適期です。

農薬は正しく使いましょう。

●ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の届く所には置かないでください。●空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。

アリスライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 TEL.03-3547-4416 FAX.03-3547-4695 <http://www.arystallifescience.jp>

16.02/OR/2/CB/A/T